

Was

Wann

Wie

Womit



**Fußböden in Praxis und Patientenstation**

– täglich  
– bei meldepfl. Tierseuchen

nass wischen  
Scheuerdesinfektion

**A\* Kombi-Flächen** 0,25 % / 1 h  
**Descocid** 0,5 % / 1 h  
**A\* Flächen Desinfektion 7** 3 % / 6 h




**Praxismöbel**

wöchentlich

abwischen

**Descocid** 0,5 % / 1 h



**Waschbecken**

täglich reinigen

nass wischen

**Descocid** 0,5 % / 1 h



**Behandlungstisch**

nach jedem Patienten und abends

– feucht wischen  
– nicht nachtrocknen  
– nass abwischen

**A\* Kombi liquid (Spray)** Konz. / 1 min  
**A\* Biguacid liquid (Spray)** Konz. / 1 min  
**A\* Kombi-Flächen** 0,25 % / 1 h



**OP-Einrichtungen bzw. OP-Tisch**

nach jeder OP und abends

– feucht wischen  
– nicht nachtrocknen  
– abwischen

**A\* Kombi liquid (Spray)** Konz. / 1 min  
**A\* Biguacid liquid (Spray)** Konz. / 1 min  
**A\* Kombi-Flächen** 0,25 % / 1 h od. 1 % / 15 min



**Med.-technische Ausrüstung**

nach Gebrauch

– feucht wischen  
– nicht nachtrocknen  
– abwischen

**A\* Kombi liquid (Spray)** Konz. / 1 min  
**A\* Biguacid liquid (Spray)** Konz. / 1 min  
**A\* Kombi-Flächen** 0,25 % / 1 h od. 1 % / 15 min



**Instrumente**  
(thermostabil oder thermolabil, z.B. Endoskope)

nach Gebrauch

– Reinigung  
– Desinfektion

**A\* Instrumentenreiniger** 1 % / 30 min  
**A\* Kombi Instrumentendesinfektion-N** 1 % / 30 min od. 3 % / 5 min

A\* = Antiseptica

Ein Desinfektionserfolg ist nur gegeben, wenn über die genannte Zeitspanne ein Feuchtigkeitsfilm nachgewiesen werden kann. Entsprechend der Unfallverhütungsvorschrift muss bei Zusatz von Flächen-Desinfektionsmitteln mit Handschuhen gearbeitet werden.

Was

Wann

Wie

Womit



**Handschuhe  
Röntgen- und  
OP-Schürzen**  
(flüssigkeitsdicht)

bei Bedarf

– feucht wischen  
– nicht nachtrocknen

**PA Haut-Antisepticum** Konz. / 15 sec  
**A\* Kombi liquid (Spray)** Konz. / 1 min  
**A\* Biguacid liquid (Spray)** Konz. / 1 min




**Tierkäfige**

täglich bzw. vor  
Neubesetzung

– feucht wischen  
– nicht nachtrocknen  
– nass wischen

**A\* Biguacid liquid (Spray)** Konz. / 1 min  
**A\* Kombi-Flächen** 0,25 % / 1h  
**Descocid** 0,5 % / 1h



**Futternäpfe**

täglich bzw. nach  
Benutzung

nass auswischen

**Descogen** 0,5 % / 1h



**Reinigungsutensilien**

nach Benutzung

thermisches Wasch-  
verfahren bevorzugen  
– wenn nicht mög-  
lich: Einlegen in Lö-  
sung

**A\* Kombi-Flächen** 1,5 % / 5 min



**Stiefel**

nach jedem Besuch

nach Reinigung mit  
Wasser und Bürste:  
– in Lösung einlegen  
– feucht wischen  
– nicht nachtrocknen

**A\* Kombi-Flächen** 1,5 % / 5 min



**Hände**

– nach jedem Patien-  
tenkontakt  
– mehrmals täglich  
  
– präoperativ  
  
– bei Verdacht auf vira-  
le Infektionsrisiken

reinigen  
  
hygienische Hände-  
desinfektion  
chirurgische  
Händedesinfektion  
Händedesinfektion

**A\* Waschpräparat**  
**Dia-Derman Wasch-Lotion**  
**PA Hände-Antisepticum** 3 ml / 30 s  
  
**PA Hände-Antisepticum** 2 x 3 ml / 3 min  
  
**Manorapid** 3 ml / 1 min



**Operationsfeld des  
Patienten**

– präoperativ:  
talgdrüsenarme  
Haut

aufsprühen und mit  
steriler Mullkom-  
presse abreiben

**PA Haut-Antisepticum** – vor Injektionen/  
Punktionen:  
15 sec  
– vor Injektionen  
von Gelenken,  
Körperhöhlen  
u. Hohlorganen  
sowie operativen  
Eingriffen: 1 min  
10 min

– präoperativ:  
talgdrüsenarme  
Haut

aufsprühen und mit  
steriler Mullkom-  
presse abreiben

**PA Haut-Antisepticum**